Compte-rendu de l'Inventaire du 29/04/2023

ZONE 2 : HAIE

COLEOPTERES	***Cetonia aurata* (Linnaeus, 1758) (14-21 mm)** La Cétoine dorée	 Individu sur inflorescence de Viorne lantane
	Comme tous les saproxylophages, la cétoine dorée a une fonction écologique de recyclage des matières organiques et ne doit donc pas être détruite à l'état de « ver blanc » (confusion possible avec le ver blanc du hanneton) car sa présence dans le compost permet d'accélérer sa maturation. L'abattage des arbres morts est responsable de sa raréfaction.	

ZONE 1 : PRAIRIE

COLEOPTERES	***Oxythyrea funesta* (Poda, 1761) (8-10mm)** La Cétoine grise	 Individu sur une fleur de bouton d'or
	L'adulte est diurne et floricole, consommant pollen, nectar voire étamines des fleurs. La larve se développe dans les matières végétales en décomposition. Le cycle de développement est d'un an. Cette espèce occupe toute l'Europe jusqu'au Caucase, ainsi que l'Afrique du nord jusqu'au Sahara. Elle est présente dans une grande variété de milieu, pelouses, prairies, garrigues, jardins, forêts. En forêt, elle est surtout présente dans les allées et clairières fleuries.	

COLEOPTERES	**Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 (5-8mm)** La coccinelle à sept points	
	On les rencontre sur les plantes infestées, d'abord colonisées par les adultes (qui se déplacent en volant), qui finissent par s'y reproduire et y pondre. Les larves viennent alors compléter l'activité de prédation. La Coccinelle à sept points peut consommer un très large spectre d'espèces de pucerons (chaque espèce de coccinelle ne peut consommer que certaines espèces de pucerons, les autres lui étant toxiques). Les adultes complètent leur régime alimentaire avec du pollen, pour une part variant de 30 à 50%. Les fourmis, qui élèvent les pucerons, les protègent fréquemment des Coccinelles.	

COLEOPTERES	**Cidnopus pilosus (Leske, 1785) (8-11mm)** La larve est terricole. Les adultes se rencontrent sur les plantes basses et les buissons. Milieux ouverts de toute l'Europe et d'Asie tempérée.	

COLEOPTERES	**Galeruca tanaceti (5-13mm)** La Galéruque de la Tanaisie Sur la photo, c'est la larve du coléoptère polyphage qui peut être confondue avec une chenille. Rencontré sur prairie ouverte et lande de mai à octobre. Plantes hôtes variées (Achillées, Stellaires, moutarde des champs, Tanaisie, Véroniques)	

ODONATES	***Ischnura elegans* (Vander Linden, 1820) (22-29mm)** L'Agrion élégant Il possède un pouvoir colonisateur important et apparait rapidement sur les pièces d'eau nouvellement créées. Les femelles pondent seules et insèrent leurs œufs dans la végétation flottante ou immergée sans jamais descendre sous la surface de l'eau. L'espèce est présente de l'ouest de l'Europe au Japon. Elle fréquente les eaux ensoleillées stagnantes et faiblement courantes, même saumâtres, acides ou modérément polluées jusqu'à 1 300 m d'altitude (localement jusqu'à 2000 m)	

DIPTERES	**Merodon equestris (Fabricius, 1794) (12mm)** La mouche des Narcisses L'adulte se nourrit du pollen et du nectar des fleurs de Lys et de Narcisses. Les larves parasitent les bulbes de ces fleurs sur lesquels elles peuvent provoquer de graves dégâts. Ce comportement ne se retrouve pas chez la plupart des autres membres de la famille, dont les larves se nourrissent de pucerons. Cette mouche imite les caractéristiques du bourdon, tant par la coloration que par la carapace velue. Cela peut être trompeur pour les oiseaux et autres animaux qui peuvent essayer de la manger ou d'interférer avec son alimentation.	

DIPTERES	**Eupeodes corollae (Fabricius, 1794) (6-10mm)** Cette espèce est pratiquement ubiquiste dans les milieux ouverts, couvrant la plupart des milieux anthropisés (cultures, pâtures, vergers, jardins, parcs…), les prairies naturelles, les milieux côtiers et les milieux montagnards jusqu'à l'étage alpin. Les larves se nourrissent de pucerons notamment sur une large gamme d'espèces cultivées de légumineuses et de céréales mais aussi de certains arbres et d'autres végétaux.	

DIPTERES	**Tipula vernalis Meigen, 1804 (13-15mm)** La Tipule printanière Les tipules font penser à de gros moustiques, mais ils sont inoffensifs. La tipule printanière est une espèce commune que l'on rencontre surtout dans les lieux humides.	

LEPIDOPTERES	**Ematurga atomaria (22-30mm envergure)** La Phalène picotée *C'*est une espèce de lépidoptères (papillons) de nuit de la famille des Geometridae. C'est la seule du genre *Ematurga* en Europe. Ses chenilles sont polyphages, consommant diverses plantes basses et arbustes. L'espèce est commune partout en France, dans les friches et les pelouses sèches.	

ARACHNIDES	**Oxyopes heterophtalmus Latreille, 1804 (♂5 à 7mm, ♀5-8mm)** Ce sont des araignées diurnes, chasseuses, capables de courir très rapidement sur les plantes basses et de bondir sur leurs proies.	

ARACHNIDES	**Pisaura mirabilis (10-15mm)** La Pisaure admirable Cette araignée ne tisse pas de toile pour capturer ses proies mais se nourrit en les chassant dans les herbes basses.	

HETEROPTERES	***Pyrrhocoris apterus* (Linnaeus, 1758) (9-12mm)** Le **gendarme**, ou **pyrrhocore**, (du grec ancien : πυρρός / *purrós*, « roux », et κόρις / *kóris*, « punaise »), appelé aussi *diable* ou *cherche-midi*, en raison de son attirance pour le soleil au zénith, est une espèce d'insectes hémiptères hétéroptères de la famille des Pyrrhocoridae. Le nom gendarme vient du fait que les couleurs et motifs rappellent les habits rouge et noir des gendarmes à partir de la fin du XVIIe siècle.	

HETEROPTERES	**Syromastus rhombeus (Linnaeus, 1767) (10-11,5mm)** Espèce polyphage surtout observée sur des Caryophyllaceae ; On la rencontre aussi sur les familles végétales suivantes : Anacardiaceae, Asteraceae, Brasicaceae, Cistaceae, Cupressaceae, Euphorbiaceae, Fagaceae, Lamiaceae, Pinaceae, Poaceae, Polygonaceae, Rosaceae. Les adultes hivernent dans la litière au pied des plantes, y pondent en avril-mai, et la nouvelle génération apparait dès juin. Elle vit dans des endroits dégagés, ensoleillés et chauds bien exposés, lisières forestières, landes, prairies, et les biotopes à végétation clairsemée basse.	

ZONE 1 : MURET/SOUCHES

MOLLUSQUES	**Cochlodina laminata (Montagu, 1803) (14-17mm)** Le Fuseau commun Le **fuseau commun** est un mollusque gastéropode hélicidé. Cet escargot n'est pas rare, mais la modestie de sa taille (de 14 à 17 mm) le rend presque invisible lorsqu'il grimpe sur un hêtre, son arbre de prédilection ; mais on peut aussi le voir sur les frênes et les trembles.	

MOLLUSQUES	**Vitrinobrachium sp (10-15 mm)**	

CRUSTACES	**Oniscus asellus Linnaeus, 1758 (18mm)** **L'Aselle des murs** L'espèce est détritivore et se nourrit principalement d'éléments végétaux en décomposition et des petits organismes associés. Il participe au recyclage de la matière organique morte. Les forêts humides de basse et moyenne altitude constituent son habitat d'origine : éboulis, fentes de rochers, feuilles mortes, souches et vieux troncs.	

Reptiles	**Podarcis muralis (Laurenti, 1768) (200mm)** **Le Lézard des murailles** Espèce méridionale étendue, répartie depuis le nord de l'Espagne, la France est ses pays limitrophes à l'est, faiblement au nord, puis profondément jusque dans les Balkans au sud, en passant par l'Italie. Très ubiquiste et commensale de l'homme, cette espèce se rencontre dans une multitude de milieux naturels ou anthropiques depuis le niveau de la mer jusque 2500 m d'altitude, avec cependant une préférence pour les substrats solides des milieux rocailleux et ensoleillées. En période de froid, elle trouve refuge dans toute sorte d'anfractuosités, des trous de vieux murs…	

ZONE 3 : BOIS

Oiseaux

***Sylvia atricapilla* (Linnaeus, 1758)**

La Fauvette à tête noire

La **Fauvette à tête noire** est une espèce de passereaux de la famille des Sylviidae dont elle est l'espèce type. Migratrice partielle, elle hiverne en Afrique tropicale, mais aussi en Europe, où elle est parfois sédentaire.

Oiseaux

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)

Le Pouillot véloce

Le **Pouillot véloce** est une espèce d'oiseaux de la famille des Phylloscopidae très répandue dans l'Ancien Monde. Il possède un chant caractéristique à deux tons dont les francophones retiennent le rythme et le son métallique ressemblant à ceux de pièces de monnaie que l'on égrène, d'où le surnom de « compteur d'écus », et que les anglophones traduisent par un *chiff-chaff.*

Oiseaux

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758

Le Pinson des arbres

Le **Pinson des arbres** (*Fringilla coelebs*) est une espèce de petits passereaux, partiellement migrateur, très répandu, de la famille des Fringillidés. C'est la plus fréquente et la plus répandue des trois espèces de pinsons. Il est présent dans toute l'Europe à l'exception de l'Islande et de la Scandinavie la plus septentrionale, son aire de répartition s'étend vers l'est jusqu'en Sibérie centrale. C'est aussi un oiseau reproducteur en Afrique du Nord et au Proche-Orient jusqu'en Iran. En Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud, le pinson a été introduit par l'homme.

Oiseaux

Chloris chloris (Linnaeus, 1758)

Le Verdier d'Europe

Le Verdier d'Europe (Chloris chloris, anciennement Carduelis chloris) est une petite espèce de passereaux partiellement migrateur, très répandu, de la famille des fringillidés.

Oiseaux	***Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774)*** **Le Rougequeue noir** Le Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) est une espèce de petits passereaux partiellement migratrice très répandue, de la famille des Muscicapidés. On l'appelle également rossignol des murailles ou queue rousse.	